

Ingelvac CircoFLEX®

Suspensión inyectable

Descripción

Vacuna de subunidades frente al Circovirus porcino tipo 2, adyuvantada con ImpranFLEX™.

Características

1 dosis única de 1 ml.

Contiene antígeno de circovirus purificado (PCA™).

Adyuvantada con ImpranFLEX™, adyuvante acuoso a base de carbómero.

Beneficios

Reduce la mortalidad de la explotación.

Mejora los parámetros productivos; incrementa la GMD; reduce el porcentaje de colas.

Mejora la rentabilidad.

Ventajas

Máxima conveniencia en la explotación; 1 sola dosis a partir de las 2 semanas de edad.

Protección completa frente a las formas tempranas y tardías de circovirus porcino.

Máxima seguridad para cerdos y ganaderos.

Especies de destino

Cerdos (a partir de 2 semanas de edad).

Indicaciones

Para inmunización activa de cerdos de más de 2 semanas de edad contra el Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2) para la reducción de la mortalidad, signos clínicos -incluyendo pérdida de peso- y lesiones en los tejidos linfoides relacionadas con las enfermedades asociadas al PCV2 (PCVD).

Además, la vacunación ha demostrado reducir la excreción nasal de PCV2, la carga viral en sangre y tejidos linfoides, y la duración de la viremia.

El inicio de la inmunidad: 2 semanas tras la vacunación.
Duración de la inmunidad: al menos 17 semanas.

Posología y administración

Administrar una única inyección intramuscular de una dosis (1 ml) a los cerdos, independientemente del peso vivo.

Advertencias

Evitar la introducción de contaminación durante el uso.

Tiempo de espera

Cero días.

Presentación

50 dosis.

100 dosis.

- Máxima protección en una sola dosis
- Sin interacción con la inmunidad maternal
- Mejora la productividad



Suspensión inyectable

Principio activo

Cada dosis de 1 ml de la vacuna inactivada contiene: Proteína ORF2 de Circovirus Porcino tipo 2: PR* mínima 1,0; PR* máxima 3,75.
*Potencia Relativa (test ELISA) por comparación con la vacuna de referencia. Adyuvante: Carbómero.

Indicaciones

Para inmunización activa de cerdos de más de 2 semanas de edad contra el Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2) para la reducción de la mortalidad, signos clínicos -incluyendo pérdida de peso- y lesiones en los tejidos linfoides relacionadas con las enfermedades asociadas al PCV2 (PCVD). Además, la vacunación ha demostrado reducir la excreción nasal de PCV2, la carga viral en sangre y tejidos linfoides, y la duración de la viremia.

El inicio de la inmunidad: 2 semanas tras la vacunación. Duración de la inmunidad: al menos 17 semanas.

Reacciones adversas

De forma muy frecuente se produce hipertermia leve y transitoria el día de la vacunación. Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Especies a las que va destinado

Cerdos (a partir de 2 semanas de edad).

Dosificación, vía y forma de administración

Administrar una única inyección intramuscular (IM) de una dosis (1 ml) a los cerdos, independientemente del peso vivo.

Recomendación para una correcta administración

Agitar bien antes de su uso. Utilizar los dispositivos de vacunación de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Evitar perforaciones múltiples.

Tiempo de espera

Cero días.

Precauciones especiales de conservación

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la caja y el envase después de (CAD). Usar inmediatamente después de abierto.

Advertencias especiales

Precauciones especiales para su uso en animales

Evitar la introducción de contaminación durante el uso.

Vacunar únicamente animales sanos.

Uso durante la gestación y la lactancia

No use este medicamento durante la gestación y la lactancia.

Incompatibilidades

No existe información disponible sobre la seguridad o eficacia del uso conjunto de esta vacuna con cualquier otra. Por consiguiente, se recomienda no administrar otras vacunas el mismo día o en momentos distintos. No mezclar con ninguna otra vacuna o producto inmunológico.

Precauciones especiales que deben observarse al eliminar el medicamento no utilizado o sus residuos

Los residuos deberán eliminarse de acuerdo con las normativas locales.

Fecha en que fue aprobado el prospecto por última vez

02.2008

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) <http://www.ema.europa.eu>

Información adicional

Esta vacuna está diseñada para estimular el desarrollo de una respuesta inmune activa frente a Circovirus Porcino tipo 2.

Frasco de 50 ml (50 dosis) ó 100 ml (100 dosis) acondicionado individualmente en una caja de cartón.

Registro n.º.: EU/2/07/079/002 (50 ml) - 003 (100 ml).

Titular y fabricante

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein, Alemania

Representante local del titular

Boehringer Ingelheim España, S.A.
Prat de la Riba, s/n
Sector Turó de Can Matas
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)